Periphere Hörstörung

Eine periphere Hörbehinderung kann an verschiedenen Stellen des Gehörs verursacht werden. Sie kann jeweils einseitig oder beidseitig auftreten. Generell unterscheidet drei Varianten:

- Schallleitungsschwerhörigkeit
- Schallempfindungsschwerhörigkeit (Innenohr-Schwerhörigkeit)
- Kombinierte Schwerhörigkeit (mit Merkmalen beider Grundformen)

Je nach Art und Ausprägung der Hörbehinderung erfolgt die technische Versorgung mit einem Luftleitungshörgerät, Knochenleitungshörgerät oder einem Cochlea Implantat.

Wir haben zum Thema Hörschädigung eine Broschüre herausgegeben, diese finden Sie unter Broschüren.

Über folgenden Link erreichen Sie die https://dgpp.de/de/leitlinien-konsensus/periphere-hoerstoerungen/Website der Deutschen Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie e.V. (DGPP). Dort finden sie den Link zu folgenden Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF) zum Thema Periphere Hörstörungen. Periphere Hörstörungen im Kindesalter Cochlea-Implantat Versorgung einschließlich zentral-auditorischer Implantate Implantierbare Hörgeräte

Zudem stehen folgende Themen als PDF-Download auf der Seite zur Verfügung: Hörversorgung bei Kindern Nachbetreuung apparativ versorgter Hörbehinderter Hörtraining nach Tomatis und Klangtherapie

---

Beim Besuch in der HNO-Klinik oder HNO-Praxis sowie beim Pädakustiker wird in regelmäßigen Abständen das Hörvermögen eines Kindes mit Hörbehinderung überprüft. Die Hörkurve wird in einem sogenannten Audiogramm, seitengetrennt für jedes Ohr, dargestellt. Häufig sind im Audiogramm mehrere Kurven und Symbole eingetragen, die auf den ersten Blick möglicherweise verwirren und Ihnen wenig über die aktuelle Hörsituation des Kindes preisgeben. Zum Thema **Audiogramme lesen** haben wir ebenfalls eine Broschüre erstellt, die sie unter Broschüren finden.

From:
https://sbbzh.de/ - **SBBZ Hören Heiligenbronn**

Permanent link:
https://sbbzh.de/beratungsstelle/peripher?rev=1608218444

Last update: **17.12.2020 16:20**